

Tema 8: Contraste de hipótesis

En este tema:

- Conceptos fundamentales: hipótesis nula y alternativa, nivel de significación, error de tipo I y tipo II, p-valor.
- Contraste de hipótesis e IC.
- Contraste de hipótesis en una población:
 - Población normal
 - Población no normal pero con muestras de tamaño grande
- Contraste de hipótesis en dos poblaciones independientes:
 - Poblaciones normales
 - Poblaciones no normales pero con muestras de tamaño grande

Hipótesis estadísticas

Definición 1.

Una *hipótesis estadística* (H) es una proposición acerca de una característica de la población de estudio. Por ejemplo: “la variable X toma valores en el intervalo (a, b) ”, “el valor de θ es 2”, “la distribución de X es normal”, etc.

Ejemplo 1.

- *Una compañía recibe un gran cargamento de piezas. Sólo acepta el envío si no hay más de un 5% de piezas defectuosas. ¿Cómo tomar una decisión sin verificar todas las piezas?*
- *Se quiere saber si una propuesta de reforma legislativa es acogida de igual forma por hombres y mujeres. ¿Cómo se puede verificar esa conjetura?*

Estos ejemplos tienen algo en común:

- *Se formula la hipótesis sobre la población.*
- *Las conclusiones sobre la validez de la hipótesis se basarán en la información de una muestra.*

Tipos de hipótesis estadísticas

- **Hipótesis paramétricas:** Una hipótesis paramétrica es una proposición sobre los valores que toma un parámetro.
 - **Hipótesis simple:** aquella que especifica un único valor para el parámetro.
Ejemplos: ' $H : \theta = 0$ ', ' $H : \theta = -23$ ', etc.
 - **Hipótesis compuesta:** aquella que especifica un intervalo de valores para el parámetro.
Ejemplos: ' $H : \theta \geq 0$ ', ' $H : 1 \leq \theta \leq 4$ ', etc.
 - **Hipótesis unilateral:** ' $H : \theta \leq 4$ ', ' $H : 0 < \theta$ ', etc.
 - **Hipótesis bilateral:** ' $H : \theta \neq 4 \Leftrightarrow H : \theta < 4 \text{ y } \theta > 4$ '
- **Hipótesis no paramétricas:** Una hipótesis no paramétrica es una proposición sobre cualquier otra característica de la población.

Ejemplos: ' $H : X \sim N$ ', ' $H : X \text{ ind. } Y$ ', etc. (no en este curso)

Hipótesis nula y alternativa

Definición 2.

Llamamos *hipótesis nula*, y la representamos por H_0 , a la hipótesis que se desea contrastar. Es la hipótesis que se plantea en primer lugar y la hipótesis que mantendremos a no ser que los datos indiquen su falsedad.

- Es una idea es similar a la *presunción de inocencia* en un juicio.
- La hipótesis nula siempre contiene los signos "=", " \leq " o " \geq ".
- La hipótesis nula nunca se acepta, se rechaza o no se rechaza.

Llamamos *hipótesis alternativa*, y la representamos por H_1 , a la negación de la hipótesis nula.

- Es generalmente la hipótesis que se quiere verificar.
- La hipótesis alternativa nunca contiene los signos "=", " \leq " o " \geq ".
- La hipótesis alternativa puede aceptarse o no aceptarse.

Hipótesis nula y alternativa

Ejemplo 2.

En cursos pasados, el número medio de préstamos por año y por alumno en la biblioteca de la Carlos III ha sido de 6. Este año la biblioteca ha hecho una campaña de información y quiere saber el efecto que ésta ha tenido entre los estudiantes.

¿Cuáles serían las hipótesis nula y alternativa en este caso?

Hipótesis nula y alternativa

Ejemplo 2.

En cursos pasados, el número medio de préstamos por año y por alumno en la biblioteca de la Carlos III ha sido de 6. Este año la biblioteca ha hecho una campaña de información y quiere saber el efecto que ésta ha tenido entre los estudiantes.

¿Cuáles serían las hipótesis nula y alternativa en este caso?

$$H_0 : \mu = 6 \quad H_1 : \mu > 6$$

Proceso del contraste de hipótesis

Hipótesis: la altura media de la población es 1.60 m
($H_0 : \mu = 1.60$)



Población




Muestreo aleatorio simple

¿Es probable que
 $\bar{X} = 1.72$ si $\mu = 1.60$?

La media muestral es 1.72 m
($\bar{x} = 1.72$)



Muestra



Si no lo es, **rechazamos** H_0


Región crítica y nivel de significación

Definición 3.

Un *contraste de hipótesis* es una regla que determina, a un cierto *nivel de significación*, α , para qué valores de la muestra se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula.

Se trata de determinar, a un nivel de significación α , una *región crítica o de rechazo*, RC_α , y una *región de aceptación*, RA_α .

$$\Omega = RC_\alpha \cup RA_\alpha \quad RC_\alpha \cap RA_\alpha = \emptyset$$



Región crítica y nivel de significación

El **estadístico del contraste** es un estadístico que se construye a partir de un estimador del parámetro y cuya distribución bajo H_0 es conocida.

El **nivel de significación** es la probabilidad de que, bajo H_0 , el **estadístico del contraste** tome valores en la RC_α .


Ejemplo 3.

Sea $X \sim N(\mu, 5)$. Queremos hacer contrastes sobre la media poblacional μ .

Estadístico (común para los tres contrastes): $T = \frac{\bar{X} - 3}{5/\sqrt{n}} \underset{H_0}{\sim} N(0, 1)$


$$H_0 : \mu = 3$$

$$H_1 : \mu < 3$$




$$H_0 : \mu = 3$$

$$H_1 : \mu > 3$$



$$H_0 : \mu = 3$$

$$H_1 : \mu \neq 3$$



Región crítica y nivel de significación

Ejemplo 2 (cont.)

Hemos tomado una m.a.s. de 100 alumnos y obtenemos $\bar{x} = 6.23$, $s = 2.77$.
¿Cuál será la región crítica para el contraste $H_0 : \mu = 6$ $H_1 : \mu > 6$?

Sea $X =$ “número de libros prestados por alumno y por año”.
 $E[X] = \mu$, $Var[X] = \sigma^2$ ambas desconocidas.

Si H_0 fuera cierta, como n es grande, sabemos que $T = \frac{\bar{X} - 6}{S/\sqrt{n}} \stackrel{A}{\sim} N(0, 1)$.

T es el **estadístico del contraste**.

Es decir, al nivel de significación α ,

$$RC_\alpha = \{x_1, \dots, x_n \mid \frac{\bar{x} - 6}{s/\sqrt{n}} > z_\alpha\} \quad RA_\alpha = \Omega \setminus RC_\alpha = \{x_1, \dots, x_n \mid \frac{\bar{x} - 6}{s/\sqrt{n}} \leq z_\alpha\}$$

donde z_α es el **cuantil α** de la distribución $N(0, 1)$.


Contraste de hipótesis

Ejemplo 2 (cont.)

Para los datos del ejemplo, $n = 100$, $\bar{x} = 6.23$, $s = 2.77$, el valor del estadístico del contraste en nuestra muestra particular es:

$$\frac{\bar{x} - 6}{s/\sqrt{n}} = \frac{6.23 - 6}{2.77/10} = 0.8303$$

Si consideremos un nivel de significación igual a 0.05, tenemos que $\frac{\bar{x} - 6}{s/\sqrt{n}} = 0.8303 < 1.645 = z_{0.05}$, es decir, nuestra muestra particular no pertenece a la $RC_{0.05}$, y por tanto, al nivel de significación 0.05, **no rechazamos la hipótesis nula**.



Tipos de errores en un contraste de hipótesis

Decisión	Estado real	
	H_0 cierta	H_0 falsa
Rechazar H_0	Error de Tipo I $P(\text{Rech.} H_0 \text{ cierta}) = \alpha$ nivel de significación	Decisión correcta $P(\text{Rech.} H_0 \text{ falsa}) = 1 - \beta$ potencia
No rechazar H_0	Decisión correcta $P(\text{No Rech.} H_0 \text{ cierta}) = 1 - \alpha$	Error de Tipo II $P(\text{No Rech.} H_0 \text{ falsa}) = \beta$

- Podemos hacer la probabilidad del error de tipo I tan pequeña como queramos, PERO esto hace que aumente la probabilidad del error de tipo II.
- Un contraste de hipótesis puede rechazar la hipótesis nula pero NO puede probar la hipótesis nula.
- Si no rechazamos la hipótesis nula, es porque las observaciones no han aportado evidencia para descartarla, no porque sea necesariamente cierta.
- Por el contrario, si rechazamos la hipótesis nula es porque se está razonablemente seguro ($P(\text{Rech.} | H_0 \text{ cierta}) \leq \alpha$) de que H_0 es falsa y estamos aceptando implícitamente la hipótesis alternativa.


Nivel crítico o p-valor

Definición 4.


El **nivel crítico, p , o p-valor** es el nivel de significación más pequeño para el que la muestra particular obtenida obligaría a rechazar la hipótesis nula. Es decir:

$$p = P(\text{Rech. } H_0 \text{ para } x_1, \dots, x_n | H_0 \text{ cierta})$$

Es decir, si $T(X_1, \dots, X_n)$ es el estadístico del contraste:




Nivel crítico o p-valor



$$RC_\alpha = \{x_1, \dots, x_n \mid T(x_1, \dots, x_n) < T_{1-\alpha}\}$$

$$\Rightarrow p = P(T(X_1, \dots, X_n) < T(x_1, \dots, x_n))$$



$$RC_\alpha = \{x_1, \dots, x_n \mid |T(x_1, \dots, x_n)| > T_{\alpha/2}\}$$

$$\Rightarrow p = P(|T(X_1, \dots, X_n)| > |T(x_1, \dots, x_n)|)$$


Nivel crítico o p-valor

Ejemplo 2 (cont.) Para los datos del ejemplo, $n = 100$, $\bar{x} = 6.23$, $s = 2.77$, al nivel de significación 0.05, **no rechazamos la hipótesis nula**. ¿Cuál es el p-valor para esta muestra? ($RC_\alpha = \{x_1, \dots, x_n | \frac{\bar{x}-6}{s/\sqrt{n}} > z_\alpha\}$)

El nivel crítico o p-valor es el nivel de significación más pequeño para el que la muestra particular obtenida obligaría a rechazar la hipótesis nula:

$$\begin{aligned} p &= P(\text{Rech.} | H_0 \text{ cierta}) \\ &= P\left(\frac{\bar{X}-6}{S/\sqrt{n}} > \frac{\bar{x}-6}{s/\sqrt{n}} \mid H_0 \text{ cierta}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z = \frac{\bar{X}-6}{S/\sqrt{n}} &\stackrel{H_0}{\sim} N(0,1) \\ &= P(Z > \frac{6.23-6}{2.77/\sqrt{100}}) \\ &= P(Z > 0.8303) = 0.2033 \end{aligned}$$



La hipótesis nula se rechazaría sólo para niveles de significación mayores que 0.2033.

Metodología

Método de construcción de un contraste de hipótesis paramétrico al nivel de significación α :

1. Plantear las hipótesis nula y alternativa (" $H_0 : \theta = \theta_0, H_1 : \theta \neq \theta_0$ ", " $H_0 : \theta = \theta_0, H_1 : \theta < \theta_0$ ", " $H_0 : \theta \leq \theta_0, H_1 : \theta > \theta_0$ ", etc.)
2. Determinar el estadístico del test, $T(X_1, \dots, X_n)$, y su distribución bajo H_0 (Formulario).
3. Dos posibilidades:
 - 3.a Construir la región crítica y comprobar si la muestra obtenida está en ella (rechazamos H_0) o no (no rechazamos H_0).
 - 3.b Calcular el p-valor para la muestra obtenida. Si $p < \alpha$, se rechaza H_0 .
4. Plantear las conclusiones.

Contraste de hipótesis e IC's

El contraste de una hipótesis nula simple frente a una alternativa bilateral

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

al nivel de significación α , es equivalente a construir un IC al $(1 - \alpha)100\%$ para θ , y a partir de él tomar la siguiente decisión:

- rechazar H_0 si θ_0 está fuera del IC.
- no rechazar H_0 si θ_0 está en el IC.

Ejemplo 4.

Supongamos que la altura (en cm) de los estudiantes de la UC3M es una v.a. X con distribución $N(\mu, 5)$. Con el objetivo de estimar μ se toma una m.a.s. de 100 estudiantes y se obtiene $\bar{x} = 156.8$.

Se quiere contrastar la siguiente hipótesis sobre esta población: "la altura media de los estudiantes de la UC3M es de 160cm" al nivel de significación 0.05.

Contraste de hipótesis e IC's

Ejemplo 3 (cont.)

Seguimos los pasos de la metodología para la construcción de contrastes:

1. Plantear las hipótesis nula y alternativa:

$$H_0 : \mu = 160 \quad H_1 : \mu \neq 160$$

2. Determinar el estadístico del test y su distribución bajo H_0 (Formulario).

$X \sim N(\mu, 5)$, por tanto

$$\frac{\bar{X} - \mu}{5/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \Rightarrow \frac{\bar{X} - 160}{5/\sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

Contraste de hipótesis e IC's

Ejemplo 3 (cont.)

3.a Construir la región crítica y comprobar si la muestra obtenida está en ella (rechazamos H_0) o no (no rechazamos H_0). Sabemos que bajo H_0

$$1 - \alpha = P \left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - 160}{5/\sqrt{n}} < z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

Por tanto

$$RC_{\alpha} = \left\{ x_1, \dots, x_n \mid \left| \frac{\bar{x} - 160}{5/\sqrt{n}} \right| > z_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

$$RA_{\alpha} = \Omega \setminus RC_{\alpha} = \left\{ x_1, \dots, x_n \mid \left| \frac{\bar{x} - 160}{5/\sqrt{n}} \right| \leq z_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

Por otra parte, el IC al $(1 - \alpha)100\%$ para μ es $\left(\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{5}{\sqrt{n}} \right)$:

$$160 \in IC \Leftrightarrow \bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{5}{\sqrt{n}} \leq 160 \leq \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{5}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow |\bar{x} - 160| \leq z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{5}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow x_1, \dots, x_n \in RA_{\alpha}$$

Contraste de hipótesis e IC's

Ejemplo 3 (cont.)

Para $\alpha = 0.05$ ($n = 100$, $\bar{x} = 156.8$):

$$\left| \frac{\bar{x} - 160}{5/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{156.8 - 160}{5/10} \right| = |-6.4| = 6.4 \quad y \quad z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

es decir $x_1, \dots, x_n \in RC_{0.05} \Rightarrow$ rechazamos H_0 al nivel de significación 0.05.

O equivalentemente, a partir del IC al 95% para μ :

$$\left(\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{5}{\sqrt{n}} \right) = \left(156.8 \pm 1.96 \frac{5}{10} \right) = (155.82, 157.78)$$

$160 \notin IC_{95\%}(\mu) \Rightarrow$ rechazamos H_0 al nivel de significación 0.05.

Hemos comprobado que es equivalente realizar el contraste al 0.05% a encontrar el IC para μ al 95% y rechazar H_0 si μ_0 no está en él.

Contraste de hipótesis e IC's

Ejemplo 3 (cont.)

3.b (Otra alternativa) Calcular el p-valor para la muestra obtenida.

$$\begin{aligned}
 p &= P(\text{Rech. } H_0 \text{ para } x_1, \dots, x_n | H_0 \text{ cierta}) \\
 &= P\left(\left|\frac{\bar{X}-160}{5/\sqrt{n}}\right| > \left|\frac{\bar{x}-160}{5/\sqrt{n}}\right| \mid H_0 \text{ cierta}\right) \\
 &\stackrel{Z = \frac{\bar{X}-160}{5/\sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)}{=} P\left(|Z| > \left|\frac{156.8-160}{5/10}\right|\right) = P(|Z| > 6.4) = 2 \cdot P(Z > 6.4) \approx 0
 \end{aligned}$$

El p-valor obtenido es menor que α ($p \approx 0 \ll \alpha$) \Rightarrow rechazamos H_0 al nivel de significación 0.05.

4. Plantear las conclusiones.

Al nivel de significación $\alpha = 0.05$, la muestra aporta suficiente evidencia para rechazar la hipótesis que establecía que la media poblacional era 160.

Contraste de hipótesis en una población

Sea X una v.a. cuya distribución depende de θ . X_1, \dots, X_n m.a.s. de X .

Sea $T(X_1, \dots, X_n)$ el estadístico del contraste

$$T(X_1, \dots, X_n) \stackrel{H_0}{\sim} P_0 \quad (\text{exacta o aproximada}) \quad \left. \vphantom{T(X_1, \dots, X_n)} \right\} \text{Formulario}^*$$

y T_α el cuantil α de la distribución P_0 .

H_0	H_1	RC_α
$\theta = \theta_0$	$\theta \neq \theta_0$	$\{x_1, \dots, x_n \mid T(X_1, \dots, X_n) > T_{\alpha/2}\}$
$\theta \leq \theta_0$	$\theta > \theta_0$	$\{x_1, \dots, x_n \mid T(X_1, \dots, X_n) > T_\alpha\}$
$\theta \geq \theta_0$	$\theta < \theta_0$	$\{x_1, \dots, x_n \mid T(X_1, \dots, X_n) < T_{1-\alpha}^{**}\}$

* Dos casos posibles: X normal o X no normal pero n grande (TCL). Hay que formular siempre TODAS las hipótesis necesarias.

** Si P_0 es simétrica respecto a 0 (N(0,1) o t-student), entonces $T_{1-\alpha} = -T_\alpha$.

Contraste de hipótesis en dos poblaciones independientes

Sea X una v.a. cuya distribución depende de θ_1 . X_1, \dots, X_{n_1} m.a.s. de X .

Sea Y una v.a. cuya distribución depende de θ_2 . Y_1, \dots, Y_{n_2} m.a.s. de Y .

X e Y **independientes**.

Sea $T(X_{1:n_1}, Y_{1:n_2})$ el estadístico del contraste

$T(X_{1:n_1}, Y_{1:n_2}) \stackrel{H_0}{\sim} P_0$ (exacta o aproximada)

} **Formulario***

y T_α el cuantil α de la distribución P_0 .

H_0	H_1	RC_α
$\theta_1 - \theta_2 = d_0^{**}$	$\theta_1 - \theta_2 \neq d_0$	$\{x_{1:n_1}, y_{1:n_2} \mid T(X_1, \dots, X_n) > T_{\alpha/2}\}$
$\theta_1 - \theta_2 \leq d_0$	$\theta_1 - \theta_2 > d_0$	$\{x_{1:n_1}, y_{1:n_2} \mid T(X_1, \dots, X_n) > T_\alpha\}$
$\theta_1 - \theta_2 \geq d_0$	$\theta_1 - \theta_2 < d_0$	$\{x_{1:n_1}, y_{1:n_2} \mid T(X_1, \dots, X_n) < T_{1-\alpha}\}$

* Dos casos posibles: X, Y normales o X, Y no normales pero n grande (TCL). Hay que formular siempre TODAS las hipótesis necesarias.

** En general, en la comparación de varianzas $d_0 = 0$.