

PROBLEMAS TEMA 2: MEDIDAS ESTADÍSTICAS BÁSICAS

Problema 1 Sean U_1 y U_2 dos variables aleatorias independientes con media cero y varianza 1. Se definen las variables:

$$X_1 = U_1, \quad X_2 = U_1 + U_2, \quad \text{y} \quad X_3 = U_1 - U_2.$$

- (a) Calcular las esperanzas y las varianzas de X_1 , X_2 y X_3 .
- (b) Escribir las matrices de covarianzas y de correlaciones de (X_1, X_2, X_3) .

Problema 2 El vector de medias y la matriz de covarianzas del vector aleatorio $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)'$ son

$$E(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad V(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Se calculan unos índices a partir de las variables anteriores, de la forma

$$\begin{aligned} Z_1 &= 0,2X_1 + 0,3X_2 + 0,5X_3 \\ Z_2 &= -0,7X_1 + 0,1X_2 + 0,2X_3 \end{aligned}$$

- (a) Proporcionar las medias (esperanzas) y las varianzas de Z_1 y Z_2 , así como la covarianza entre Z_1 y Z_2 a partir de $E(\mathbf{X})$ y de $V(\mathbf{X})$.
- (b) Calcular las covarianzas entre cada una de las variables originales X_1 , X_2 y X_3 y cada uno de los índices Z_1 y Z_2 .
- (c) Obtener los coeficientes de correlación lineal entre cada una de las variables originales X_1 , X_2 y X_3 y cada uno de los índices Z_1 y Z_2 .

Problema 3 Para el estudio de las ventas de una librería se seleccionan cuatro recibos. En dichos recibos aparece la cantidad total de euros, y el número de libros vendidos. Llamamos X_1 a la cantidad total en euros, y X_2 al número de unidades. Los datos aparecen en la tabla siguiente

Recibo	X_1	X_2
1	42	4
2	52	5
3	48	4
4	58	3

- (b) Representar los datos en un plano. ¿Crees que existe correlación lineal entre X_1 :cantidad total en euros y X_2 :número de unidades?
- (a) Calcular el vector de medias muestral $\bar{\mathbf{x}}$, la matriz de covarianzas muestral S_X y la matrix de correlaciones muestral R_X del vector $X = (X_1, X_2)'$.

Problema 4 Los datos de la tabla corresponden a chalets construídos por diez promotoras que operan a lo largo de la costa española.

Promotora	X_1 : Duración media hipoteca (años)	X_2 : Precio medio (millones euros)	X_3 : Superficie media (m^2) de cocina
1	8.7	0.3	3.1
2	14.3	0.9	7.4
3	18.9	1.8	9.0
4	19.0	0.8	9.4
5	20.5	0.9	8.3
6	14.7	1.1	7.6
7	18.8	2.5	12.6
8	37.3	2.7	18.1
9	12.6	1.3	5.9
10	25.7	3.4	15.9

- Dibujar un diagrama de dispersión entre X_1 y X_2 , otro entre X_1 y X_3 , y otro entre X_2 y X_3 .
- Calcular las medias muestrales y las varianzas muestrales de X_1 , X_2 y X_3 . Decir qué par de variables está correlado linealmente.
- Calcular las matrices de covarianzas y de correlaciones muestrales de (X_1, X_2, X_3) .

Problema 5 Consideremos las $n = 5$ observaciones

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 8 \\ -2 & 7 \\ 5 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

de un vector aleatorio $\mathbf{X} = (X_1, X_2)'$. Definimos las combinaciones lineales $Z_1 = \mathbf{c}'\mathbf{X}$ y $Z_2 = \mathbf{b}'\mathbf{X}$, donde $\mathbf{c} = (-2, 1)'$ y $\mathbf{b} = (-1, 3)'$.

- Calcular los valores de Z_1 y de Z_2 para las 5 observaciones. Obtener las medias muestrales, las varianzas muestrales y la covarianza muestral entre los valores de Z_1 y Z_2 .
- Obténganse las medias muestrales, las varianzas muestrales y la covarianza muestral entre las observaciones de Z_1 y de Z_2 , pero ahora usando las fórmulas estudiadas para combinaciones lineales de vectores aleatorios. Comparar el resultado con el obtenido en (a).